

CONTENIDO NETO:

25, 50, 100, 250 y 500 ml

FÓRMULA:

Cada ml de solución contiene:

Enrofloxacin.....0 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Número de Registro: Q-0254-004

USO VETERINARIO

SOLUCIÓN INYECTABLE

ENROFLOXACINA 5% está indicado en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos (perros). En las infecciones susceptibles a la Enrofloxacin en enfermedades como colibacilosis, micoplasmosis, neumonía enzoótica porcina, bronconeumonías, clamidiosis y diarreas inespecíficas.

ESPECIES:

Bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos (carne y leche), porcinos y caninos (perros).

DOSIS:

Bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos (carne y leche), porcinos: Aplicar 1 mL de **ENROFLOXACINA 5%** por cada 20 kg de peso vivo, equivalente a 2.5 mg de Enrofloxacin/kg, cada 24 horas, durante 3 a 5 días. **Caninos (perros):** Aplicar 1 mL de **ENROFLOXACINA 5%** por cada 10 kg de peso vivo, equivalente a 5 mg de Enrofloxacin/kg, cada 24 horas, durante 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular.

ADVERTENCIAS:

- No se debe usar este producto 12 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No se consuma la leche de bovinos y caprinos tratados, hasta después de 5 días del último tratamiento.
- La enrofloxacin solamente deberá administrarse en indicaciones importantes y graves después de asegurar el diagnóstico bacteriológico y cuando existieran resistencias.
- En el caso de caninos, no administrar a cachorros, ya que está comprobado que la Enrofloxacin inhibe el crecimiento de las articulaciones.
- Mantener el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. - Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

