

CONTENIDO NETO:

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL

FÓRMULA:

Cada 1 mL contiene:

Enrofloxacin base.....100.0 mg

Vehículo, c.b.p.....1.0 mL

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Registro SAGARPA: Q-0254-016

USO VETERINARIO

SOLUCIÓN INYECTABLE

ENROFLOXACINA INY 10% es un antibiótico eficaz contra bacterias Gram (+): *Staphylococcus spp*, *Streptococcus suis*, Gram (-): *Enterobacteriaceae*, *Pasteurella multocida*, *E. coli*, *Mannheimia haemolytica*, *Histophilus somni*, *Chlamydophila felis*, *Rickettsia*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Klebsiella pneumoniae* y *Mycoplasma spp*, indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas causadas por bacterias sensibles a la Enrofloxacin.

ESPECIES:

Bovinos productores de carne, equinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS:

Bovinos productores de carne, equinos, porcinos: 2 mL por cada 40 kg de peso (equivalente a 5 mg de Enrofloxacin base por kg de peso vivo), cada 24 h, durante 3 a 5 días.

Caninos y felinos: 0.25 mL por cada 5 kg de peso (equivalente a 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso vivo) cada 24 h, durante 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos productores de carne: Subcutánea.

Equinos: Intravenosa e intramuscular.

Porcinos: Intramuscular.

Caninos: Intramuscular e intravenosa.

Felinos: Intramuscular.

TIEMPO DE RETIRO:

-No administrar este producto 28 días antes del sacrificio de los bovinos productores de carne destinados al consumo humano.

-En porcinos el tiempo de retiro es de 5 días.

-No administrar este producto en equinos destinados al consumo humano.

ADVERTENCIAS:

-No administrar en animales menores a 8 meses de edad.

-Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.

-Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

