

CONTENIDO NETO:

10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Florfenicol.....200.0 mg
Tilosina tartrato.....100.0 mg
Vehículo, c.b.p.....1.0 mL

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Registro SAGARPA: Q-0254-019

USO VETERINARIO

SOLUCIÓN INYECTABLE



Flortylon está indicado para el tratamiento de infecciones de origen bacteriano como neumonía enzoótica, pleuroneumonía, complejo respiratorio bovino (CRB), salmonelosis y colibacilosis, entre otras causadas por bacterias sensibles a la formulación.

ESPECIES:

Bovinos productores de carne y porcinos.

DOSIS:

Bovinos productores de carne: 1 mL de **Flortylon** por cada 15 kg de peso vivo, equivalente a 13.3 mg de florfenicol + 6.7 mg de tilosina por kg de peso vivo. Se recomienda repetir la dosis a las 48 horas después de la primera aplicación.

Porcinos: 1 mL de **Flortylon** por cada 30 kg de peso vivo, equivalente a 6.7 mg de florfenicol + 3.3 mg de tilosina por kg de peso vivo. Se recomienda repetir la dosis a las 48 horas después de la primera aplicación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular

TIEMPO DE RETIRO:

- No administrar este producto 28 días antes del sacrificio de los bovinos destinados al consumo humano.
- El tiempo de retiro en porcinos destinados al consumo humano es de 21 días.
- No se administre este producto a bovinos productores de leche para consumo humano.

ADVERTENCIAS:

- No administrar más de 10 mL en el mismo sitio de aplicación.
- Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.