

### CONTENIDO NETO:

100, 250 y 500 ml

### FÓRMULA:

Cada ml de solución contiene:

Oxitetraciclina base

(como clorhidrato de eccl).....200 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml

### CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

### SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Número de Registro: Q-0254-002

### USO VETERINARIO

### SOLUCIÓN INYECTABLE



**OXITETRACICLINA 200 L.A.** En Bovinos, Ovinos, Caprinos, se utiliza para combatir infecciones clínicas del aparato digestivo y respiratorio, aborto por causas infecciosas: metritis, mastitis, pododermatitis, pasteurelosis ocasionada por el transporte, (septicemia hemorrágica), está indicada en el tratamiento de anaplasmosis. En Porcinos, la **OXITETRACICLINA 200 L.A.** se utiliza en el tratamiento de neumonía enzoótica, infecciones respiratorias, abortos de origen infeccioso, síndrome de M.M.A. (Metritis, Mastitis, Agalactia).

### ESPECIES:

Bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos (carne y leche) y porcinos.

### DOSIS:

**Bovinos productores de carne y leche, ovinos, caprinos (carne y leche) y porcinos:** Aplicar 1 mL de **OXITETRACICLINA 200 L.A.** por cada 20 kg de peso vivo, equivalente a 10 mg de Oxitetraciclina/kg, cada 12 horas, durante 5 días continuos.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

### ADVERTENCIAS:

- No se debe usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No consumir la leche de vacas y cabras tratadas con este producto hasta 10 días o 20 ordeñas después de la última aplicación.
- Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor a 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.**