

CONTENIDO NETO:

Jeringa con 10g

FÓRMULA:

Cada Jeringa de 10 g contiene:

Ceftiofur HCl200.0 mg

Vehículo, c.b.p.10.0 g

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Número de Registro: Q-0254-022

USO VETERINARIO

SOLUCIÓN INYECTABLE

MAX-TT es una suspensión para aplicación intramamaria con efecto antibiótico, para el tratamiento de mastitis aguda y crónica en vacas lactantes causadas por bacterias sensibles a la formulación

ESPECIES:

Bovinos productores de carne leche.

DOSIS:

Bovinos productores de leche: Aplicar una jeringa de 10 g de **Max-TT** por cuarto afectado. Repetir la dosis cada 24 horas, durante 3 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria.

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpiar, ordeñar y desinfectar completamente los cuatro pezones. Retire el tapón protector inmediatamente antes de la aplicación del producto, evitando la contaminación del contenido. Introducir la cánula de la jeringa de Max-TT por el orificio del pezón. Perfundir suave y totalmente el contenido de la jeringa. Aplicarse masaje ascendente desde la base del pezón hasta la parte superior del cuarto.

TIEMPO DE RETIRO:

- No administrar este producto 2 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No utilizar para consumo humano la leche procedente de animales tratados con este producto hasta 72 horas después de la última aplicación.

ADVERTENCIAS:

- Retire el tapón de la cánula inmediatamente antes de su introducción en el orificio del pezón.
- Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Las cefalosporinas pueden tener reacción cruzada de hipersensibilidad con las penicilinas.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

