

CONTENIDO NETO:

SACO CON 1 Kg-10 Kg-20 Kg

FÓRMULA:

Cada 1000 g contienen:

Florfenicol.....40.0 g

Excipiente, c.b.p.....1000.0 g

POLVO (PREMEZCLA MEDICADA)

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Número de Registro: Q-0254-024

USO VETERINARIO

FLORFENICOL 40 PREMIX es una premezcla medicada cuyo ingrediente activo es un antibiótico análogo flourinado del tianfenicol de origen sintético de amplio espectro usado para el tratamiento de enfermedades respiratorias y gastroentéricas de los porcinos y las aves. En la especie porcina trata enfermedades neumónicas como enfermedad respiratoria porcina cuyo agente etiológico es la pasteurella multocida. En aves es usada en el tratamiento de enteritis bacteriana causada por *Escherichia Coli*.

ESPECIES:

Porcinos y aves de engorda.

DOSIS:

En porcinos: 10 mg de florfenicol por kg de peso (pv) equivalente a 250 mg de **Florfenicol 40 Premix** por día: para una ingesta diaria de alimento balanceado de 50 g/kg de peso, esta dosis corresponde a una tasa de incorporación de 5 kg de **Florfenicol 40 Premix** por tonelada de alimento balanceado, es decir 200 ppm de florfenicol, durante 5 días continuos.

En aves: 30 mg de florfenicol por kg de peso (pv) equivalente a 750 mg de **Florfenicol 40 Premix** por día: para una ingesta diaria de alimento balanceado de 125 g/kg de peso, esta dosis corresponde a una tasa de incorporación de 7 kg de **Florfenicol 40 Premix** por tonelada de alimento, balanceado es decir 240 ppm de florfenicol, durante 5 días continuos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

TIEMPO DE RETIRO:

- Porcinos carne 15 días.

- Aves carne 7 días.

ADVERTENCIAS:

-No administrar en aves productoras de huevo destinado a consumo humano.
“**SEGURIDAD AMBIENTAL:** los envases y los residuos de **Florfenicol 40 Premix** deberán desecharse en forma segura en contenedores para tal fin conforme a la normatividad vigente de **SEMARNAT**”.

-La administración de **Florfenicol 40 Premix** no debe exceder la dosis y el tiempo indicado en la etiqueta.

- **Florfenicol 40 Premix** no deberá de administrarse en gestación o lactación porcina.

- **Florfenicol 40 Premix** no debe administrarse en cerdos (verracos) destinados a la reproducción.

-Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.

-Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

