

CONTENIDO NETO:

SACO CON 1 Kg-10 Kg-20 Kg

FÓRMULA:

Cada 1000 g contienen:

Oxitetraciclina base.....200.0 g

Excipiente, c.b.p.....1000.0 g

PREMEZCLA MEDICADA

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Número de Registro: Q-0254-025

USO VETERINARIO

OXITETRACICLINA 200 PREMIX es un antibiótico bacteriostático, que pertenece al grupo de las tetraciclinas. En aves es eficaz en el tratamiento de la micoplasmosis (*M. gallisepticum*, *M. synoviae*), coriza infecciosa (*Haemophilus paragallinarum*) y cólera aviar (*Pasteurella multocida*). En porcinos es efectivo para tratar la neumonía enzoótica (*M. hyopneumoniae*), leptospirosis (*L. interrogans*, *L. borgpetersenii*) y erisipela (*Erysipelothrix rhusiopathiae*), mientras que en bovinos enteritis bacterianas y neumonías (*Pasteurella multocida*).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Aves (engorda-reemplazo-reproducción y pavos),
Porcinos (todas las edades y etapas de crecimiento),
Bovinos (carne).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en alimento.

DOSIS:

Aves (engorda-reemplazo-reproducción y pavos): Administrar de 0.5 a 2.5 kg de **Oxitetraciclina 200 Premix** por tonelada de alimento balanceado, equivalente a 10 mg - 50 mg de Oxitetraciclina requerido para tratar un kilogramo de peso corporal.

Porcinos (todas las edades y etapas de crecimiento): Administrar de 1.5 a 2.5 kg de **Oxitetraciclina 200 Premix** por tonelada de alimento balanceado, equivalente a 30 mg - 50 mg de Oxitetraciclina requerido para tratar un kilogramo de peso corporal.

Bovinos (carne): 10 g de **Oxitetraciclina 200 Premix**/cabeza/día, equivalente a 10 mg de Oxitetraciclina requerido para tratar un kilogramo de peso corporal.

TIEMPO DE RETIRO:

-No se administre este producto 5 días antes del sacrificio de los porcinos y bovinos destinados para consumo humano. El tiempo de retiro en pollos de engorda es de: 24 horas

ADVERTENCIAS:

- No se administre **Oxitetraciclina 200 Premix** en aves en producción de huevo que se destine al consumo humano. No se administre a bovinos productores de leche.

- Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.

-Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. "Seguridad ambiental los envases y los residuos de **Oxitetraciclina 200 Premix** deberán de desecharse en forma segura en contenedores para tal fin conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT".

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

