

CONTENIDO NETO:

1 kg, 10 kg y 20 kg

FÓRMULA:

Cada 1000 g contienen:

Tilosina osato.....0.0 g

Excipiente, c.b.p.....1000.0 g

ANTIMICOPLÁSMICO PREMEZCLA MEDICADA (POLVO)

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Número de Registro: Q-0254-026

USO VETERINARIO



TYLOSINA 220 PREMIX antibiótico efectivo en el tratamiento de enfermedades causadas por bacterias Gram positivas y algunas Gram negativas incluyendo Mycoplasma spp. En porcinos es efectivo en casos de ileitis, enteropatías proliferas porcinas (EPP), complejo respiratorio porcino (CRP) y neumonía enzoótica. En pollos de engorda está indicado para el tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (ERC).

ESPECIES:

Porcinos y pollos de engorda.

DOSIS:

Porcinos: 455 g de **Tylosina 220 Premix** (100 ppm de Tilosina fosfato) por tonelada de alimento, durante 3 semanas.

Pollos de engorda: ERC ocasionada por Mycoplasma; 4 a 5 kg de **Tylosina 220 Premix** (800 a 1000 ppm de Tilosina fosfato) por tonelada de alimento, como dosis única en pollos de 0 a 5 días de edad, seguido de una segunda administración en el alimento durante 24 a 48 horas entre la 3ª y 5ª semana de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en alimento.

TIEMPO DE RETIRO:

-No administrar este producto 14 días antes del sacrificio de los porcinos destinados para consumo humano.

-El tiempo de retiro en pollos de engorda es de 5 días.

ADVERTENCIAS:

-No administrar en aves productoras de huevo para consumo humano.

-Usar mascarilla al momento de preparar la mezcla.

-Conservar en un lugar fresco y seco, a una temperatura no mayor de 30°C.

-Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.